

COLLEZIONI ZOOLOGICHE FATTE NELL'UGANDA  
DAL DOTT. E. BAYON.

XIII (1)

ANTHICIDAE (COL. HÉTÉROMÈRES)

PAR M. PIC

---

Si le nombre des espèces capturées par le D.<sup>r</sup> Bayon est peu élevé, par contre, trois espèces nouvelles donnent à ses récoltes un intérêt tout particulier; en outre des nouveautés, je puis signaler comme espèce intéressante le *Pr. suturalis* Pic (sans bande suturale foncée) et quelques *Tomoderus* que je crois devoir rapporter au *T. Kolbei* Pic que j'ai récemment nommé d'après un seul exemplaire appartenant au Musée de Berlin (Kgl. Zoolog. Museum).

Voici l'énumération, avec notes complémentaires et descriptions des nouveautés, des espèces recueillies par le D.<sup>r</sup> Bayon.

(1) Collezioni zoologiche fatte nell'Uganda dal Dott. E. Bayon. I. On a small collection of Reptiles, Batrachians and Fishes made by Dr. E. Bayon in Uganda. By G. A. Boulenger, F. R. S. [Ann. Mus. Civ. Genova, 3.<sup>a</sup> Ser., IV (XLIV) 1908, p. 5].

Collezioni zoologiche ecc. e. s., II. Contribuzione allo studio degli *Ichthyurus* africani di R. Gestro (loc. cit. 1909, p. 188).

Collezioni zoologiche ecc. e. s., III. On a second collection of Reptiles, Batrachians and Fishes made by Dr. E. Bayon in Uganda. By G. A. Boulenger, F. R. S. (loc. cit. 1909, p. 302).

Collezioni zoologiche ecc. e. s., IV. Chrysididae di Giacomo Mantero (loc. cit. 1909, p. 450).

Collezioni zoologiche ecc. e. s., V. Contribuzione alla conoscenza dei Miriapodi dell'Uganda di F. Silvestri (loc. cit. 1910, p. 457).

Collezioni zoologiche ecc. e. s., VI. Pseudoscorpions from Uganda collected by Dr. E. Bayon by Edv. Ellingsen (loc. cit. 1910, p. 536).

Collezioni zoologiche ecc. e. s., VII. Buprestidae par Ch. Kerremans (loc. cit. 1910, p. 512).

Collezioni zoologiche, ecc., e. s., VIII. Seconda contribuzione alla conoscenza delle Chrysididae dell'Uganda di Giacomo Mantero (loc. cit. 1910, p. 513).

Collezioni zoologiche, ecc., e. s., IX. Appunti sui Paussidi di R. Gestro (loc. cit. 1910, p. 550).

Collezioni zoologiche, ecc., e. s., X. Nota sulle *Hispidae* di R. Gestro (loc. cit. XLV, 1911, p. 23).

Collezioni zoologiche, ecc., e. s., XI. Studi sugli *Ichthyurus* di R. Gestro (loc. cit. 1911, p. 52).

Collezioni zoologiche, ecc., e. s., XII. On a third collection of Fishes made by Dr. E. Bayon in Uganda, 1908-1910. Pl. I-III. By G. A. Boulenger (loc. cit. 1911, p. 64).

**Pristocyphus** (= **Hypaspistes** Wat.) **suturalis** Pic var.

Victoria Nyanza: Buvuma, un seul exemplaire.

**Notoxus ?cucullatus** Laf. Étant donné la variabilité de certains *Notoxus*, et le manque de caractères précis de certaines descriptions anciennes, il est impossible d'identifier avec certitude certains insectes de ce genre: je rapporte avec doute au *cucullatus* Laf. les exemplaires variant un peu par le sommet des élytres à peine, ou nettement, testacé, recueillis par le D.<sup>r</sup> Bayon dans l'Uganda, à Bussu-Busoga.

**Amblyderus obscuripennis** n. sp. *Rufescens, elytris obscuris, antennis pedibusque testaceis, nitidus, longe griseo pubescens. Capite et thorace scabris; capite postice truncato; thorace antice multi-dentato, dentibus mediis validioribus; elytris postice attenuatis, sat fortiter punctatis.*

Roux avec les élytres obscurcis, les antennes et pattes étant testacées, brillant, revêtu d'une longue pubescence grise, espacée et en partie redressée. Tête et prothorax ornés d'aspérités irrégulières, yeux noirs, tête tronquée postérieurement et un peu élargie en arrière; antennes courtes, grêles à la base avec les derniers articles élargis, subglobuleux; prothorax assez court, rétréci en arrière, à peu près de la largeur de la tête en avant, multidenté antérieurement avec les dents médianes plus fortes; élytres relativement courts, à épaules peu marquées, rétrécis et séparément arrondis au sommet, à ponctuation peu dense, plus forte en avant. Long. près de 3 mill.

Victoria Nyanza: Buvuma.

Cette espèce est des plus distinctes par la coloration foncée de ses élytres et peut prendre place près de *sabulosus* Pic.

**Tomoderus Kolbei** Pic. Cette espèce, voisine du *Kraatzi* Pic et en différant par sa tête subtronquée postérieurement et la ponctuation élytrale disposée en rangées assez régulières au moins sur le disque, varie un peu par sa forme plus ou moins robuste et la coloration des antennes quelquefois en partie rembrunie, enfin par les élytres variablement obscurcis sur leur milieu et en arrière mais ayant toujours la base plus claire. L'unique exemplaire qui a servi à la description est robuste, a les antennes jaunâtres et le milieu des élytres nettement obscurci.

Uganda: Bussu-Busoga.

**Anthicus ugandanus** n. sp. *Elongatus et angustatus, griseo pubescens, capite thoraceque fere opacis, nigris; thorace postice ulbido limbato et capite antice rufo maculato; elytris subnitidis, nigris, ante medium et lateraliter albo-flavo maculatis: antennis apice compressis, nigris, ad basin testaceis; pedibus pallidis, femoribus pro majore parte obscuris.*

Allongé et étroit, pubescent de gris, presque mat sur l'avant-corps et peu brillant sur les élytres, en majeure partie noir. Tête robuste, un peu plus large que le prothorax, tronquée et échancrée postérieurement, densément ponctuée, noire mais marquée de roux en avant; antennes longues, minces à la base, comprimées à l'extrémité à peu près comme dans le genre *Ochlthenomus* Laf., noires à base testacée, dernier article roussâtre au sommet; prothorax densément ponctué, assez long, modérément dilaté-élargi au avant et droit sur les côtés vers la base, sillonné sur le disque postérieurement, noir avec une bordure basale blanchâtre; élytres déprimés, assez longs, subparallèles, un peu plus larges que le prothorax à la base, diminués obliquement en avant, subarrondis séparément au sommet, finement ponctués, noirs avec une macule externe d'un blanc jaunâtre placée dans une dépression, celle-ci touchant presque le bord externe mais assez éloignée de la suture, placée un peu en dessous des épaules; pattes courtes, d'un testacé pâle avec les cuisses largement rembrunies; dessous du corps un peu roussâtre, abdomen noir; pygidium un peu saillant, noir. Long. 3 mill.

Uganda: Bussu-Busoga.

Cette nouveauté, remarquable par sa forme, peut se placer près de *inhumeralis* Pic, dont elle se distinguera facilement par ses épaules marquées, la base du prothorax blanche, etc.

**Anthicus floralis** L. et var.

Victoria Nyanza: Bugala.

**Anthicus Bottegoi** Pic et var.

Victoria Nyanza: Bugala, Bussu-Busoga.

**Anthicus biplagiatus** Laf. et var. À base élytrale tantôt étroitement foncée, tantôt rousse et se fondant ainsi avec la macule antérieure de cette coloration.

Uganda: Bussu-Busoga.

**Anthicus Bayoni** n. sp. *Paulum elongatus, subnitidus, griseo pubescens, niger, antennis ad basin pedibusque pro majore parte testaceis. Capite breve, truncato et thorace dense punctatis, illo antice sat fortiter dilatato; elytris subparallels, fortiter sat dense punctatis.*

Peu allongé, pubescent de gris, cette pubescence en partie soulevée, courte et peu serrée, à peine brillant sur l'avant corps, un peu sur les élytres, noir avec les élytres parfois vaguement rembrunis, base des antennes et majeure partie des pattes testacées. Tête et prothorax densément ponctués, la première grosse, tronquée postérieurement, le deuxième un peu plus long que large, fortement élargi-arrondi en avant, à peu près de la largeur de la tête; antennes peu longues, grêles, très peu épaissies vers l'extrémité, noires mais plus ou moins testacées vers leur base; élytres assez longs, presque parallèles, peu rétrécis et subarrondis au sommet, à ponctuation forte, pas très dense; pattes grêles, testacées avec les cuisses plus ou moins obscurcies, parfois aussi une partie des fémurs. Long. 3 mill. environ.

Uganda: Bussu-Busoga.

Très voisin de *usambarensis* Pic, mais tête faiblement échancrée en arrière, base des antennes testacée, pattes non entièrement foncées, etc.

Cette dernière espèce figure aussi dans la collection Pic.

---